

Πεδία χρήσης και Στοχευόμενοι οργανισμοί: #1 Για εσωτερικούς χώρους - Οικιακούς ποντικούς και/ή αρουραίους • #2 Για εξωτερικούς χώρους περιμετρικά κτιρίων - Οικιακούς ποντικούς και/ή αρουραίους • #3 Για εξωτερικούς ανοικτούς χώρους και χωματερές - Αρουραίους • #4 Για υπονόμους- Αρουραίους.

Οι αριθμοί σε παρένθεση αντιπροσωπεύουν τα Πεδία χρήσης και Στοχευόμενους οργανισμούς:

Μέθοδος εφαρμογής: (1,2): Δολωματική εφαρμογή. Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση). (1,2,4) Καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης. (2) Απευθείας χρήση στις στοές που δημιουργούν τα τρωκτικά. (3) Δολωματική εφαρμογή. Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση εντός δολωματικών σταθμών ασφαλείας (tamper-resistant) ή σε προστατευμένα σημεία δόλωσης ή απευθείας στις στοές που δημιουργούν τα τρωκτικά. (4) Ετοιμόχρηστο δόλωμα που στερεώνεται ή τοποθετείται εντός δολωματικών σταθμών έτσι ώστε το δόλωμα να μην έρθει σε επαφή με τα λύματα.

Δόση και συχνότητα εφαρμογής: (1,2) Ποντικοί: Μέχρι 40γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης, Αρουραίοι: Μέχρι 200γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης. (2,3) Δόλωση σε στοές: 20-200 γρ. δολώματος ανά στοά. (3) Μέχρι 200γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Υψηλή προσβολή: Μέχρι 200γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 5 μέτρα. Χαμηλή προσβολή: Μέχρι 200γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 10 μέτρα. (4) Σε υπονόμους, τοποθετήστε μέχρι 200 γρ. δολώματος ανά φρεάτιο εισόδου.

Ειδικές οδηγίες: (1,2,3) Απομακρύνετε το προϊόν που έχει απομείνει στο τέλος της περιόδου εφαρμογής. (2,3) Προστατεύετε το δόλωμα από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή, χιόνι, κ.λπ.). Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς σε χώρους οι οποίοι δεν είναι πιθανό να πλημμυρίσουν. Αντικαταστήστε σε οποιοδήποτε σημείο δόλωσης το δόλωμα που έχει καταστραφεί από το νερό ή έχει επιμολυνθεί με ρύπους. (4) Τα δολώματα πρέπει να τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε να μην έρχονται σε επαφή με το νερό και να μην εκπλύνονται. (1,2,3,4) Ακολουθήστε οποιεσδήποτε συμπληρωματικές οδηγίες που παρέχονται στον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.

Μέτρα μετριασμού του κινδύνου ανά χρήση: (1,2,3) Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους (π.χ. άτομα που διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή όπου θα γίνει εφαρμογή) για το ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει]. (1,2) Εξετάστε το εν-



RODEX OKTABLOK

ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟ

RB - Δόλωμα έτοιμο για χρήση

Τύπος Προϊόντων:
ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνα

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΧΡΗΣΤΕΣ**

Αριθμός Άδειας: KY-0022
Κάτοχος της άδειας: PelGar International Ltd
18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon, France

Οικιακοί ποντικοί και αρουραίοι:
• *Mus musculus* (Οικιακός ποντικός)
• *Rattus norvegicus* (Καφέ αρουραίος)

Για όλα τα στάδια ανάπτυξης.

Πεδίο Εφαρμογής: Για εσωτερικούς χώρους, εξωτερικούς χώρους περιμετρικά κτιρίων, εξωτερικούς ανοικτούς χώρους και χωματερές, υπονόμους.

Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: bromadiolone 0,005% β/β.
Περιέχει πικραντικό παράγοντα.
Χρώμα: κόκκινο.
Βοηθητικές ουσίες: 99,995% β/β

Διανομέας: L. Lambrou Agro Ltd
Τηλ. 22667908
www.lambrouagro.com.cy

1.5 KG

PES095A/1.5 KG/21.10.2013



5 291249 155346



δεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών. (1,2,3) Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αντιμετώπισης (π.χ. τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα. (1,2,3) Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα για την πρόσληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών. (1,2,3,4) Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στο πλαίσιο διαδικασίας αντιμετώπισης με τακτική τοποθέτηση δολώματος (pulse baiting). (1) Πριν από τη χρήση τρωκτικοκτόνων προϊόντων, θα πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης μη χημικών μεθόδων αντιμετώπισης (π.χ. παγίδες). (1,2,3) Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν απευθείας στις στοές που δημιουργούν τα τρωκτικά. (1) Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από σημεία στα οποία έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα μη στόχοι. (4) [Εάν απαιτείται από την εθνική νομοθεσία] Τοποθετείτε τα δολώματα μόνο σε συστήματα αποχέτευσης που συνδέονται με σταθμό επεξεργασίας λυμάτων.

Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις για προστασία του περιβάλλοντος: (1,2,3) Όταν τα σημεία δόλωσης είναι κοντά σε επιφανειακά ύδατα (π.χ. ποτάμια, ρυάκια, οχετοί νερού, χαντάκια, αυλάκια άρδευσης) ή συστήματα αποχέτευσης νερού, βεβαιωθείτε ότι τα δολώματα δεν έρχονται σε επαφή με το νερό.

Γενικές Οδηγίες χρήσης: • Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται από το σημείο πώλησης • Πριν την έναρξη της εφαρμογής, διενεργήστε επιτόπιο έλεγχο στην προσβεβλημένη περιοχή ώστε να προσδιορίσετε τα είδη των τρωκτικών, τους χώρους δραστηριότητάς τους, καθώς και την πιθανή αιτία και έκταση της προσβολής • Καθαρίστε το χώρο από πιθανές τροφές στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ. χυμένοι σπόροι ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίσετε τον μολυσμένο από τρωκτικά χώρο ακριβώς πριν την έναρξη της διαδικασίας αντιμετώπισης, καθώς κάτι τέτοιο διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά. • Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης τρωκτικών (που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατό, φυσιικές μεθόδους αντιμετώπισης. • Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. προσδιορισμένες δια-

δρομές, σημεία κατασκευής φωλιάς, σημεία τροφής, τρύπες, λαγούμια, κ.λπ.). • Όπου είναι δυνατό, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές • Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση που να δηλώνει ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται • Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχει γίνει εφαρμογή με τρωκτικοκτόνα θα πρέπει να επισημαίνονται καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής και να υπάρχει ειδοποίηση που να επεξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό, ενώ κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης δολωμάτων θα πρέπει να αναφέρονται και τα μέτρα πρώτων βοηθειών που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης • Τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλιζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό να συρθούν εκτός του δολωματικού σταθμού • Τοποθετείτε το προϊόν μακριά παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα μη στόχοι • Τοποθετείτε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και μακριά από μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά • Φοράτε γάντια χημικής προστασίας κατά το στάδιο χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών προσδιορίζεται από το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της L. Lambrou Agro) • Φοράτε προστατευτική φόρμα που είναι αδιαπέραστη από το βιοκτόνο προϊόν (το υλικό προσδιορίζεται από το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της L. Lambrou Agro) κατά τη διάρκεια του γεμίσματος και του καθαρισμού του δολωματικού σταθμού • Φοράτε προστατευτική μάσκα κατά τη διάρκεια του γεμίσματος και του καθαρισμού του δολωματικού σταθμού • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια σας και τα εκτεθειμένα μέρη του σώματος αμέσως μετά τη χρήση του • Η συχνότητα επίσκεψης στις περιοχές εφαρμογής δολωμάτων, εξαρτάται από τον χειριστή που το πρίσμα της έρευνας που έγινε κατά την έναρξη της καταπολέμησης. Η συχνότητα αυτή πρέπει να είναι σύμφωνη με τις συστάσεις που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής • Εάν η πρόσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά είναι χαμηλή σε σύγκριση με το μέγεθος της προσβολής, εξετάστε το ενδεχόμενο να μετακινήσετε τους δολωματικούς σταθμούς σε άλλα σημεία και να χρησιμοποιήσετε δολώματα με διαφορετική σύνθεση • Εάν μετά από 35 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής, συνεχίζεται η κατανάλωση δολωμάτων και δεν παρατηρείται καμία μείωση στη δραστηριότητα των τρωκτικών, τότε θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία που το προκαλεί. Όταν έχουν αποκλειστεί άλλα αίτια, είναι πιθανόν τα τρωκτικά να έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, εξετάστε το ενδεχόμενο χρή-

σης ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, όπου υπάρχει, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Επίσης, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης παγίδων, ως ένα εναλλακτικό μέτρο ελέγχου. • Δόλωμα σε σακουλάκια: Μην ανοίγετε τα φακελάκια που περιέχουν το δόλωμα. **Μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου:** Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους ότι θα γίνει εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει] • Οι πληροφορίες που παρέχονται στο προϊόν (π.χ. ετικέτα και/ή φύλλο οδηγιών χρήσης) θα πρέπει να αναγράφουν σαφώς ότι: • δεν επιτρέπεται η πώληση του προϊόντος στο ευρύ κοινό (π.χ. «μόνο για επαγγελματίες χρήστες»). • Να μην χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ανθεκτικότητας στην δραστική ουσία. • Τα προϊόντα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για διάστημα άνω των 35 ημερών χωρίς να γίνει αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής • Για λόγους διαχείρισης της ανθεκτικότητας, μην εναλλάσσετε τα αντιπηκτικά σκευάσματα με άλλα αντιπηκτικά παρόμοιας ή χαμηλότερης ισχύος. Σε περίπτωση όπου αποφασιστεί εναλλαγή χρήσης με άλλα τρωκτικοκτόνα, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε μη αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα, εάν υπάρχουν, ή ισχυρότερα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα • Μεταξύ των εφαρμογών, μην πλένετε με νερό τους δολωματικούς σταθμούς ή τα σύνεργα που χρησιμοποιείτε σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία τοποθέτησης δολωμάτων. • Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. **Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του:** Κατά το τέλος της περιόδου καταπολέμησης, απορρίψτε τυχόν δόλωμα που δεν έχει καταναλωθεί και τη συσκευασία του προϊόντος σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. **Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης:** • Αποθηκεύετε σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό και μακριά από το ηλιακό φως • Αποθηκεύστε σε χώρους που δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και παραγωγικά ζώα • Διατηρήστε το στην αρχική συσκευασία. Στις συνθήκες αυτές η διάρκεια του προϊόντος είναι τουλάχιστον: 24 μήνες. **Άλλες πληροφορίες:** Λόγω της καθυστερημένης δράσης των αντιπηκτικών τρωκτικοκτόνων, μπορεί να χρειαστούν 4 έως 10 ημέρες από την κατανάλωση του δολώματος για να υπάρξει αποτελεσματικότητα. Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς ασθενειών. Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, κατά την απόρριψή τους χρησιμοποιείτε γάντια ή ερ-



KΙΝΔΥΝΟΣ
Δηλώσεις επικινδυνότητας: H360D: Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. H372: Προκαλεί βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. EUH208: Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. **Δηλώσεις προφύλαξης:** P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια. P270: Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό. P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε γιατρό. P314: Αναζητήστε ιατρική συμβουλή σε περίπτωση που δεν αισθάνεστε καλά. P405: Φυλάσσετε και κλειδωμένο. P501: Διάθεση του περιεχομένου σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. **Πρώτες Βοήθειες** - **Αντίδοτο:** Σε περίπτωση: - Δερματικής έκθεσης, πλύνετε πρώτα το δέρμα με νερό και στη συνέχεια, με νερό και σαπούνι. - Οφθαλμικής έκθεσης, ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό έκπλυσης ματιών ή σκέτο νερό, κρατήστε τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά. - Στοματικής έκθεσης, ξεπλύνετε το στόμα προσεκτικά με νερό. Ποτέ μη χορηγείτε σιδήριση από το στόμα σε αναισθητό άτομο. Μην προκαλείτε εμετό. - Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος. - Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισημαίνονται με τις ακόλουθες πληροφορίες: «να μην ανοίγεται και να μην μετακινείται» «περιέχει τρωκτικοκτόνο» «ονομασία προϊόντος & αριθμός άδειας» «δραστική(ές) ουσία(ες)» και «σε περίπτωση ατυχήματος, τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηριάσεων. Σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο, επικοινωνήστε με κτηνίατρο. - Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα. - Αυτό το προϊόν περιέχει αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν να εμφανιστούν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία στα ούλα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή τα ούρα. **Αντίδοτο:** Βιταμίνη K1 χορηγούμενη μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.

Τηλέφωνο κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Αρ. Παρτίδας: 708231211/50 • Ημερομηνία Παραγωγής: 12/2024 • Ημερομηνία Λήξης: 12/2026